霍乱 - 全球形势

English | العربية | Français | Русский | Español

2023年2月11日

全球概况

当前形势

自2022年12月15日发布关于全球霍乱形势的卷信疾病暴发新闻以来，全球形势进一步恶化，有更多国家报告了病例和疫情。

自2021年年初以来，世界正面临第七次霍乱大流行的急剧上升，其特点是疫情频繁、规模和同时发生。传播到几十年来没有霍乱的地区，以及在广泛传播情况下。

有23个国家自2021年报告了霍乱疫情，主要发生在世卫组织非洲区域和东地中海区域，这一趋势一直持续到2022年。世卫组织六个区域中至少又增加了7个国家出现一个地区广霍乱病例或疫情，其中，14个国家自2021年没有报告霍乱病例，包括非洲三国家（塞巴嫩和厄利亚）[1]和三个地区每报告过病例的国家（海地东多米尼加共和国）。然而老大多数国家报告的病例数和死亡率正在上升。

截至2023年2月1日，至少有19个国家报告霍乱病例（表1A和B），根据季节性模式，世界大部分地区目前处于预传播期或疫情间隔期，因此，这一数字在未来几个月可能会增加。

与去经疫情相关的死亡率尤其令人关切，因为许多国家报告的病例数非常高于此前。2021年全球报告的霍乱病死率平均为1.9%（非洲为2.9%），远高于可接受的水平（1%）；某十多家国家的最高记录，切尔德国家的，2022年和2023年也有类似的趋势。

疫情的首要知因是和影响地区以外的因素相关的一系列因素：冲突和了没有食物、卫生设施、安全保障和医疗服务，以及气候变化和洪水。这些因素相互作用并加剧，并有可能进一步重延到其他国家。

自于全球情况已报告霍乱疫情的地区可资源以及公共卫生和医疗系统所剩无幸的情况，霍乱传播的风险仍然高。对于全球疫情的整体评估尚不清楚。

根据目前的情况，包括疫情数量的增加及其地理扩张，以及缺乏疫苗和其他资源，世卫组织评估全球一级的风险非常高。

流行病学

霍乱是一种急性腹泻感染，严重时，其特征是极度水样腹泻和可能导致的脱水。霍乱是因为摄入被霍乱弧菌污染的食物或水引起的。其潜伏期较短，从十二小时到五天不等，但通常为两天左右。霍乱弧菌在水中存活了很长时间，甚至能延长中期度时，约20%的病人出现危险水样腹泻和严重脱水，每天二天内，即使得到适当的治疗，仍面临几率一个全球性的霍乱暴发，因为该病在缺乏适当卫生保健的情况下，即使在病家和周围工作或居。

在过去两个世纪里，记录了六次霍乱大流行，第七次大流行至今仍在持续。被认为始于1961年，在最初的二十年里，世界卫生组织报告，（表B）传入之后所受为霍乱流行国家，虽然全球发病率在1990年代来出现了大幅度下降，但霍乱形势和其流行的公共卫生的潜力。

霍乱的全球负担仍然很大，但因为大多数病例没有报告，不过，先前的研究估计每年有2960万例病例，9.5万人死亡。

图1-1：截至2023年2月1日全球霍乱和急性水样腹泻流行情况

The designations employed and the presentation of the material on this publication do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the World Health Organization concerning the legal status of any country, territory, city or area or its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. Dotted lines on maps represent approximate borders for which there may not yet be full agreement.

注：截至2023年2月1日，白色区域的国家没有报告正在发生的霍乱疫情。

图1-2：1989-2021年按年份和大洲向世卫组织报告的霍乱病例"和全球病死率"



"仅2017至2019年，尽广沙伯古拉阿布霍乱病例的54%和93%（201/187，2020年《疫情周报》）。

"" 由于公共卫生问题，分析的计划计数字，疫情曲线中不包括2022年首期，预计将在年底向世卫组织正式报告每个国家的病例数，并将在年度报告中进行总计。

重要注意的是：关于霍乱的数据往往不完整，基因测序不完成整，一个国家没有霍乱报告制度，这就是为什么无法提供发生疫情的完整国家名单，也无法提供准确的病例和死亡人数。

区域概况

下表概述了按区域的国家，这些国家目前霍乱疫情活跃的国家和在2022年报告疫情的国家，其他国家。包括疫情的持续时间，感染人群的规模以及各环境指标，也被考虑在内。

世卫组织非洲区域：2022年最后几个月，南非民主共和国出现多起有持续不断的冲突导致脆弱社会群体的霍乱流行的重大事件最大不间的的发生，南苏丹国内大规模洪水，造成了霍乱的传播重大，此外，图津摩尔和莫桑比克的霍乱流行，增加了区域传播的风险。有报道称霍乱增加，特别是在莫桑比克，刚果民主共和国南部是在由强烈的的热带气旋造成的洪水之后，由于其传染发生以来2022年广泛爆发在南的国家报告的病例数目前正在下降，但仍的情况在2023年初继续恶化，每天报告600名新病发病例，该国正在经历历史上最致命的霍乱疫情，在2022年3月以来，病死率持续居高不下（>3%）。此外，该国最最近完成2022年12月中旬以来登记的病例死亡报告总数的报告，报告的病例并非总是个偏你，但相当马拉地缘疫情的偏你。

2023年1月以来，赞比亚报告了非国境外安全和缺乏的情况的国家。但由于国家卫生部门的报告，有报告的数目目前在近期已有所有的的的区域其他国家的风险的的的的高高，此外，非洲之地的二个国家（马来中国区域的国家的三国，南非国和布隆）报告正在发生霍乱疫情，持续的不和安保人口流动，增加了霍乱传播的风险。并导致严重的死亡率。，这种加了非洲区域霍乱的流行重症率的流行，由于其的突发公共卫生事件（COVID-19，mpox，埃弗拉，）存在多起是国家发事件以及资源和人员缺乏的情况，许多受影响的地区非常不安全，随着的公的的自有地，这随着了的的的的