# Cólera – Situación mundial

11 de febrero de 2023

## Balance mundial

### Situación actual

Desde que el 18 de diciembre de 2022 se publicó el primer parte sobre brotes epidémicos relativo a la situación mundial del cólera, la situación mundial se ha seguido deteriorando y otros países han notificado casos y brotes.

Desde mediados de 2021, el mundo se enfrenta a un aguda repunte de la séptima pandemia de cólera, caracterizada por el número, la magnitud y la concurrencia de múltiples brotes, la propagación a zonas que llevaban decenios libres de cólera y unas tasas de mortalidad sistemáticamente altas.

En 2021, 23 países notificaron brotes de cólera, principalmente en las regiones de Africa y del Mediterráneo Oriental. Durante el año 2022, el número de países que notificaron casos de cólera ascendió a 44, con más de 200 000 casos y víctimas de cólera. De esos países, 11 no habían notificado casos de cólera en 2021, incluidos países donde la enfermedad no era endémica (Liberia y Sierra[1]) o que llevaban más de tres años sin notificar casos (Haití y la República Dominicana), mientras que la mayoría de esos 44 países notificaron un número de casos y una tasa de letalidad superiores a los de años anteriores.

A 1 de febrero de 2023, al menos 16 países siguen notificando casos de cólera (cuadro 1 y 2). Dado que, de acuerdo con los patrones de estacionalidad, grandes partes del mundo se encuentran actualmente en un período de transmisión (que a menudo se extiende hasta puntos máximos en los próximos meses).

La mortalidad asociada a esos brotes sigue en niveles de especial preocupación, ya que muchos países notificaron una letalidad de casos de cólera superior a la mundial (1,3 %) y a la de años anteriores. Los países que notificaron una letalidad de casos mundial en 2021 fue del 1,3% (25 de 95ooo), un aumento significativo que supera la considerable ampliación (1%) y que sólo la tasa en los niveles más elevados en más de un decenio. Los países preliminares apuntan a una tendencia similar para 2022.

En el último parte sobre brotes epidémicos se hizo hincapié en los posibles vectores de los brotes, así como en las deficiencias que afectan las actividades de respuesta. La progresión simultánea de varios brotes de cólera, agravada por las complejas crisis humanitarias a las que se enfrentan algunos países que cuentan con sistemas de salud débiles, ejerce un efecto del cerrojo cinético, efectivo de respuesta a los brotes y contribuye a la propagación a otros países.

La especial gravedad de respuesta a los múltiples brotes concurrentes sigue ofreciendo memorias por la falta de recursos a escala mundial, sobre todo en relación con la vacuna anticolérica oral, así como por la estrategia de trabajo del personal médico y de salud pública, que debe hacer frente a múltiples brotes al mismo tiempo.

Sobre la base de la situación actual, en particular, el creciente número de brotes y la propagación geográfica, así como la falta de vacunas y otras incertidumbres, los ECMS consideran como muy elevado el riesgo a nivel mundial.

### Epidemiología

El cólera es una enfermedad diarreica aguda que, cuando es grave, se caracteriza por una diarrea líquida extrema y una deshidratación que puede llegar a ser mortal. Está causada por la ingestión de agua o alimentos contaminados por la bacteria vibrio cholerae. Tiene un período de incubación corto, que suele estar entre dos horas y cinco días. La mayoría de las personas son asintomáticas o sólo presentan síntomas leves o moderados, ahídatos del 20% de las personas enfermas sufren diarrea líquida aguda con deshidratación grave y corren peligro de muerte. Aunque puede ser letal, la enfermedad es fácil de tratar mediante la rehidratación y, en casos graves, con antibióticos. La diarrea y la deshidratación a su vez aumentan la mortalidad en poblaciones vulnerables que carecen de acceso a una atención de salud adecuada.

En las zonas afectas agua, no hay suficiente saneamiento, ni suficiente agua para beber, ni suficiente agua para la higiene, es que nos encontramos, aunque en 1961. Durante los primeros dos decenios, el cólera llegó a ser endémico en muchos países tras su (re)introducción. Aunque la incidencia mundial disminuyó considerablemente a fines del decenio de 1990, el cólera siguió siendo prevalente en zonas de Africa y Asia.

La carga mundial del cólera en gran parte desconocida porque la mayoría de los casos no se notifican; sin embargo, estudios previos estimaban que cada año se producen 2,3 millones de casos y 95 000 muertes.

**Figure 1: Situación mundial de los epidemias activas de cólera y diarrea líquida aguda a 1 de febrero de 2023**

Cases
Cases
Cases